

大麦技術情報

- 大麦の出穂早まる。
- 赤かび病の防除は遅れずに行いましょう。

○ 出穂期予想 : 4月10日頃

今年の大麦は生育が早まっており、例年より10日間程度早く出穂する見込みです。
※ 圃場によって生育が異なりますので、必ず出穂を確認して下さい。

○ 赤かび病防除は必ず実施(2回防除の徹底)

※ 今年から新しい粉剤「ワークアップDL粉剤」の散布ができるようになりました。
「ワークアップ粉剤DL」 + 「トップジンM粉剤」 の、粉剤2回防除体系が可能。

粉剤による防除	防除時期	薬剤名	使用量
1回目	穂揃期	ワークアップ粉剤DL	3kg/10a
2回目	1回目の7~10日後	トップジンM粉剤	4kg/10a

無人ヘリによる防除	防除時期	薬剤名	使用量
1回目	穂揃期	トップジンMゾル	8倍/800cc
2回目	1回目の7~10日後	チルト乳剤	8倍/800cc

防除時期目安	第1回目	第2回目
	4月13日頃~	4月20日頃~

※ 播種日や生育状況により差がありますのでご注意下さい。

【注意点】

- ・ 赤かび病は、開花期以降の降雨が多くなると発生しやすくなります。
- ・ 穂がピンク色になる症状が出てからでは農薬を散布しても効果がありません。

※ 生育調査結果、出穂予定日、防除予定日については裏面を参照下さい。