

コシヒカリ・夢ごちの栽培暦

(単位:10a当たり)

月 日	4 / 15~	5 / 5~	5 / 15	5 / 30	6 / 10	7 / 8	7 / 12	7 / 22	7 / 30	9 / 10
作業内容	播種	育苗管理		田間除草剤散布	溝切り	中干し	防除	防除	防除	水取り
生育時期	出芽	播種 (1株3~4本)		(1株15本)	(1株18本)	有効分けつ決定期	最高分けつ期	幼穂形成期	出穂期 穂ばらみ期	成熟期
管理のねらい	健苗育成	補欠痛みをさせない		早期に分けつ確保	倒伏させない 健全穂づくり	穂の充実状態を良くする			実りを良くする	
施肥 (土づくり)	・昨年倒伏した圃場は10a当たり ・ようりん40kg散布	基肥 地力にあわせて施用する		黒色の実化が著しい場合のみ (窒素が5~7kg または 珪酸が20kg)	倒伏の恐れがある場合のみ (ようりん40kg または 珪酸が40kg)	・基肥1回目は 幼穂長7~10cm 葉色3.5 1株本数20本の時施用	・基肥2回目は 1回目の7日後施用	・ワラは全量すき込み ・ケイカル200kg、ようりん40kg 施して腐熟促進		
追肥	— 食塩 併用 米立水 兼用 ベース状 兼用 一括肥料	有機フミン042 20kg	有機フミン042 20kg	34ペースト1号 18kg	有機入りユーゴ→282 43kg	中干しは基準とおり		ふくい有機50 16kg (地力窒素の発現普通)	ふくい有機50 13kg	一括肥料では施用しない
用肥	— 食塩 併用 米立水 兼用 ベース状	有機フミン042 0~10kg	有機フミン042 0~7kg	34ペースト1号 0~6kg	有機フミン042 20kg	中干しはやや早く		ふくい有機50 13kg (地力窒素の発現多い)	ふくい有機50 10kg	
水管理	— 食塩 併用 米立水 兼用 ベース状	有機フミン042 20kg	全層施肥 ; 有機フミン042 20kg	042号 10kg ; 34ペースト1号 17~18kg	有機フミン042 20kg	中干しはやや遅く		ふくい有機50 20kg (地力窒素の発現少ない)	ふくい有機50 16kg	もう5cmの深耕
防除	稲消毒 種子消毒	苗立枯病	稲 除草剤 兼用 葉散布		常発地の 葉イモチ防除 (粒剤散布)	葉イモチ防除 (粉剤散布)	穂イモチ + 紋枯病	穂イモチ 紋枯病	穂イモチ 紋枯病 カメムシ	
水管理										